

І.В. Сінельникова, О.В. Гарбар, Д.А. Гарбар **ФАУНА П'ЯВОК ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ВИДОВИЙ СКЛАД І БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ** // Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. – С.143–144

Представники класу П'явки – надзвичайно цікава і своєрідна група тварин, які поширені в прісних водоймах, морях, болотах. Серед них є хижаки, що живляться дрібними тваринами (моллюсками, черв'яками), та напівпаразити, що живляться кров'ю хребетних тварин.

Практичне значення п'явок досить різноманітне: їх здавна використовують у медицині для лікування гіпертонічних захворювань, тромбозів, набряків, крововиливів. У наш час їх розводять для отримання біологічно активних речовин (гірудину тощо). Цих червів споживають деякі види риб та інші тварини. Разом із тим п'явки можуть спричиняти загибель деяких видів риб і водоплавних птахів, вони є переносниками патогенних організмів і паразитів.

Метою дослідження є визначення видового складу п'явок Чуднівського району Житомирської області. Матеріал для дослідження збирали у липні – серпні 2012 року у водоймах Чуднівського району. На місці п'явок фіксували 96% -вим розчином етилового спирту. Визначення видів проводили за загальноприйнятими методиками [1, 2].

Всього за період дослідження зібрано 66 екз. п'явок. У результаті дослідження на території Чуднівського району виявлено 4 види цих тварин (табл. 1).

Таблиця 1

Фауна п'явок досліджених водойм Чуднівського району

Пункт збору	Види п'явок	Кількість екз.
смт.Чуднів (р.Тетерів)	<i>B. paludosa</i>	1
	<i>H. octoculata</i>	9
с.П'ятка (р.П'яток)	<i>G. complanata</i>	3
	<i>H. octoculata</i>	20
с.Тютюнники (озеро)	<i>G. complanata</i>	3
	<i>H. octoculata</i>	7
с.Пилипівка (озеро)	<i>G. complanata</i>	1
	<i>H. costata</i>	3
с.Великі Коровинці (ставок)	<i>H. octoculata</i>	19

Як видно з таблиці, домінуючим видом у Чуднівському районі є Глотківка звичайна (*Herpobdella octoculata*), яка зустрічається майже у кожній досліджуваній водоймі. Найбільша її кількість зосереджена у ставку с. Великі Коровинці. Вид Жабоп'явка болотна (*Batrachobdella paludosa*) зустрічається лише на території смт.Чуднів у досить малій кількості. На

території с.Пилипівка знайдено ще один вид п'явок П'ядунка черепащача (*Haementeria costata*). Досить поширеним видом є Слимакоп'явка звичайна (*Glossiphonia complanata*), яка зустрічається на території с. П'ятка, с.Тютюнники, с. Пилипівка, але чисельність її досить низька.

Література

1. Кутикова Л.А. Старобогатов Я. И. – Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1977. – 512 с.
2. Лукін Є.І. – Фауна України: Том 30. П'явки. Зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та практичне значення п'явок.–Київ: Вид-во АН УРСР, 1962.–196 с.